

しんがたころなういるすかんせんしょう 新型コロナウイルス感染症

だい ぱ とつにゆう おみくろん かぶきんきゅうたいさく ばっすい 「第6波」突入 オミクロン株緊急対策(抜粋)

れいわ ねん がつ にち
令和4年1月11日

ぎふけんしんがたころなういるすかんせんしょうたいさくほんぶ
岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部

ぜんこく おみくろん かぶ きんせん ひろ いま だい ぱ かちゆう
全国でオミクロン株による感染が拡がり、今や「第6波」の渦中にありま
す。ほんけん としあ いこう かんせんしゃ きゅうぞう
本県においても年明け以降、感染者が急増しており、これまでにない
かんせんばくはつ けいかい じょうきょう
感染爆発を警戒すべき状況にあります。

けんみん みなさま じしん たいせつ かぞく いのち ちいき
県民の皆様におかれましては、ご自身や大切なご家族の命、そして地域
しゃかい けいざい まも ひ つづ とりく ねが
社会・経済を守るため、引き続きの取組みをお願いします。

おみくろんかぶ とくちょう 【オミクロン株の特徴】

- かんせんりょく つよ する たかぶ ばいていど
・感染力の強さがデルタ株の3倍程度。
 - する たかぶ にちていど はっしょう きかん おみくろんかぶ
・デルタ株では5日程度であった発症までの期間が、オミクロン株では3
にちていど ほんけん かんせんれい
日程度(本県の感染例)
 - わくちん かいせつしゅ しゅうけいか ばあい はっしょうよぼうこうか ていど
・ワクチン2回接種から20~24週経過した場合、発症予防効果は10%程度
まで低下(英国の報告)
- ほんけん おみくろんかぶかんせんかくていしゃ たいはん わくちんせつしゅずみ
※本県オミクロン株感染確定者の大半がワクチン接種済。

かんせんぼうしたいさく きょうか 【感染防止対策の強化】

1 基本的感染防止対策の徹底

- きほんてきかんせんぼうしたいさく てつてい けいぞく
・「基本的感染防止対策」の徹底を継続。

ますく ちやくよう しゅしえいせい みつかいひ かんき たいちようふりようじ
①マスク着用、②手指衛生、③密回避、④こまめに換気、⑤体調不良時には
すべて こうどう す とつぶ
全ての行動をストップ

- かんせんりすく たか い か ばめん かいひ
・感染リスクが高まる以下の「5つの場面」の回避。

いんしゅ ともな こんしんかいなど おおにんずう ちようじかん およ いんしよく ますく
①飲酒を伴う懇親会等、②大人数や長時間に及ぶ飲食、③マスクなしでの
かいわ りよう へや といれ きょうようぶぶん ようちゅうい きゅうけいしつ こういしつ
会話、④寮の部屋やトイレなど共用部分は要注意、⑤休憩室・更衣室・
きつえんしつなど ようちゅうい
喫煙室等是要注意

2 いどう 移動

- ・ じゅうてん そ ち くい き 重点措置区域などの かんせんかくだいちいき 感染拡大地域への ふようふきゅう いどう 不要不急の移動は きょくりよくかいひ 極力回避。

3 いんしょく 飲食

- ・ おおにんずう 大人数・ ながじかん さ け る 長時間を避ける (4 にん 4人まで、 2 じかんい ない 2時間以内が目安)