

かぶ かくだい そ し オミクロン株 拡大阻止!!

かぶ とくちょう
オミクロン株の特徴

つよ かんせんりよく
強い感染力

はや はつびょう
早く発病

2かい せつしゆすみ
ワクチン2回の接種済
かんせん かのうせい
でも感染の可能性

ふつう かぜ しょうじょう つよ なんにち つうきんとう ふかのう
普通の風邪よりも症状が強く、何日か通勤等が不可能に。

きほんてき かんせんぼうしたいさく ふせ
でも、基本的な感染防止対策により防ぐことができます。



かいめ せつしゆ けんとう ねが
3回目のワクチン接種の検討をお願いします

しゅるい はや せつしゆ じゅうよう
ワクチンの種類よりも、できるだけ早く接種することが重要です!

かいめ せつしゆ ていこうりよく こうたいか おおはばじょうしょう
どちらのワクチンで3回目を接種しても、抵抗力(抗体価)は大幅上昇。

かいめせつしゆご 3回目接種後について		せい ファイザー製	せい モデルナ製
こうたいか 抗体価	せつしゆ にちご (接種から28日後)	ばい 54.1倍	ばい 67.9倍
ふくはんのう 副反応 はつせいわりあい 発生割合	いじょう ほつねつ 38℃以上の発熱	21.4%	49.2%
	ぜんしんけんたいかん 全身倦怠感	69.1%	78.0%
	ずつう 頭痛	55.0%	69.6%

ふくはんのう せつしゆ にちご はつげん もっと たか 3にちご しょうしつ しょうしょうこうひょう
※副反応は接種1日後の発現が最も高く、3日後にはほぼ消失します (厚労省公表データより)

はる ぎょうじ ちゅうい
春の行事にご注意ください

はなみ とまな おおにんずう ちようじかん こんざつ
お花見、イースターなどに伴う大人数・長時間のパーティや混雑した

ばしよ がいしゅつ かんせん たか こうどう さ
場所への外出など、感染リスクの高い行動は避けてください。